

家庭菜園

Q & A

問題解決!



農産部 担い手課 営農主幹  
検校 哲也

**Q1** 菊の穂先がたれてし  
おれるのですが、病気で  
すか。

**A1** それは、キフスイカミ  
キリ(菊吸髪切虫)のし  
わざです。しおれた茎に奇妙  
な傷が残っています。まわ  
りのヨモギやハルジオンなど  
の雑草もやられてませんか。  
キフスイカミキリの成虫は  
4月から6月に飛んできて、茎  
を噛んで傷つけ卵を産みます。  
菊は水の通り道を傷つけられ  
たので上の方がしおれてしま  
います。




卵からかえった幼虫は茎の  
中を移動し、地ぎわで越冬し  
ます。早春に蛹となり、4月に  
は成虫となって飛び始めます。  
スミチオンやモスピランといっ  
た殺虫剤で防除する手はあり  
ますが、朝夕に捕まえるのが  
確実です。また、しおれた茎に  
は幼虫がいます。傷から5cmほ  
ど下を切り取り焼却処分しま  
す。あわせて、周辺の雑草を取  
ります。特にキク科雑草を除  
草します。



一度は虫に食べられた菊で  
すが、茎を切った下から腋芽  
(わきめ)が生えてきます。一  
輪咲きの立派な菊は諦めて、  
うまく摘芯して長くたくさん  
の花を楽しんでください。

**Q2** ミカンの実がいつぱい  
ついたのですが、ポロポ  
ロと落ちて、ほんの少ししか残  
りませんでした。どうしてで  
すか？

**A2** 果物の多くは咲いた  
花の半分も最後まで大  
きくなりません。みかんだと、  
6月にポロポロと落ちます。生  
理落果と呼びます。木が自ら  
育てきれない実を落としてし  
まう自己調節作用です。木が  
弱っていたりすると、持ちこた  
えられなくて、多くの実を落  
とすことになります。



生理落果のあと残った果実  
をすべて育てると、大きくなら  
なかつたり、翌年の実の付きが  
少なくなつたりします。

そこで、摘果します(7~9  
月)。傷があつたり、変形した  
実、小さい実を落とします。特  
に、日の当たらない内側、ふと  
ころにある実と、その部分の  
実は思い切って落とします。  
上向きの実、くっついて重  
なっている実を落としてゆき、  
1枝に1個、葉っぱ25枚に1個  
にしていきます。  
摘果によって、木への負担が  
減り、翌年の実の着きが良く  
なります。

**Q3** スイカの食べごろを  
教えてください。

**A3** スイカは追熟しませ  
ん。買ってすぐ食べざる  
のが正解です。  
メロンなど、収穫してしばらく  
置いてから食べる果物には、  
何日ごろが食べ時ですと書い  
てあります。

スイカは、15℃前後で保存  
すれば2週間ほどは鮮度を保  
てますが、なるべく早く食べた  
方がおいしさを損ねません。  
産地では、熟れる前に収穫し  
ません。追熟しないことを考  
えて、最高の時期に収穫して、す  
ぐ出荷し店頭へ届けています。



オンライン  
農業塾  
はじめました!

