

令和5年産稲作こよみ

～目指せ!! 1等比率90%以上!!

除草剤のポイント

水口、水尻をしっかり止め、**散布後7日間**は落水、掛け流しを行わないようにしましょう。
地域で同一の除草剤を使い、効果を高めましょう。

品質の向上

心白・乳白米対策

開花期に**間断かん水**や**かけ流し**をするなどして、水温が上がらないようにしましょう。

適切な肥培管理

適切な量の肥料散布により、品質の向上を行いましょ

高温障害のポイント

- ・稲わら全量投入
- ・**農力アップ**の散布
- ・**ケイ酸加里**の散布
- ・過度な中干し注意
- ・出穂前後の水切れ注意
- ・**間断かん水**の実施
- ・早期落水の防止

ジャンボタニシ防除

ピンク色の卵は水中に落としてください!
※絶対に卵は手で触らない!
ジャンボタニシが**活動を始めた時**が薬剤散布のタイミング!
スクミンベイト3は水の濁りが落ち着いてから散布しよう!

カメムシ防除

畦畔や圃場周辺の**除草**を行うことで発生リスクは低減します!
キラップ粒剤は出穂7日～10日前が散布のタイミング!
斑点米を減らそう!

・種子更新 ・生産履歴の記帳 ・農産物検査の受検 **JA米の3要件**をしっかり行いましょう!

品種	播種	冬期			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			
		10月～3月上旬			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
コシヒカリ	4/1	稲わら全量投入	土壌改良材の散布	防除①	田植	防除②				品質向上	防除③	出穂				収穫										
あさひの夢	4/10			防除④	ひたひた水	中干し	間断かん水	完全落水																		
あいちのかおり	4/25			防除④	ひたひた水	中干し	間断かん水	完全落水																		

土づくり

(10a当たり)

資材名	使用時期	施肥量
農力アップ	10月～3月	100kg
ケイ酸加里プレミア 34	出穂45日～35日前	20～40kg

種子消毒

(種籾10kg水20ℓ当たり)

資材名	対象業害虫	使用方法	
テクリードCフロアブル 100cc	いもち病・褐条病・ごま葉枯病・苗立枯細菌病・苗立枯病・ばか苗病・もみ枯細菌病	200倍 24時間浸種	浸種前

施肥基準

(10a当たり)

品種名	肥料銘柄	施肥量
コシヒカリ	早生用ひとまきくん	50kg
	早生・標準米ベスト【側条】	30kg
あさひの夢	中生用ひとまきくん	60kg
	中生用米ベスト【側条】	35kg
あいちのかおり	中生用ひとまきくん	60kg
	中生用米ベスト【側条】	35kg

雑草防除

◎初期除草

(10a当たり)

防除	除草剤名	使用時期	使用方法	
①	エリジャン乳剤	代播後～ 移植7日前まで	300ml	原液 湛水散布
	エリジャンジャンボ	代播後～ 移植7日前まで	300g	個包装のまま 投げ入れ

◎初・中期除草剤

(10a当たり)

防除	除草剤名	使用時期	使用方法	
②	ジャスタIキロ粒剤	移植時および移植直後～ ノビエ3.5葉期移植後30日まで	1kg	湛水散布
	ジャスタジャンボ	移植後1日～ ノビエ3葉期移植後30日まで	400g	個包装のまま 投げ入れ

病害虫防除

(10a当たり)

防除	除草剤名	使用時期	使用方法	
①	ヨーパルパワーEV	いもち病・紋枯病・白葉枯病・イネミズゾウムシ・イネドロオイムシ・ウンカ類・チョウ目害虫	50g/箱	は種前～ 移植当日
③	キラップ粒剤	カメムシ類・ウンカ類	3kg	湛水散布 出穂7～10日前
④	スクミンベイト3	スクミリングガイ(ジャンボタニシ)	2～4kg	散布 発生時

2022年10月1日登録反映
農業の使用にあたっては、有効期限(最終有効年月)以内の農業をラベルの記載に従って使用してください。

水田から被覆肥料の殻を流出させない対策をお願いします。

JAあいち海部

検索



稲作暦の情報はホームページで!