

### 除草剤のポイント

水口、水尻をしっかり止め、**散布後7日間**は落水、掛け流しを行わないようにしましょう。

### 品質の向上

**心白・乳白米対策**  
開花期に間断かん水やかけ流しをするなどして、水温が上がらないようにしましょう。  
**適切な肥培管理**  
適切な量の肥料散布により、品質の向上を行いましょ

### 高温障害のポイント

- ・稲わら全量投入
- ・農力アップの散布
- ・ケイ酸加里の散布
- ・過度な中干し注意
- ・出穂前後の水切れ注意
- ・間断かん水の実施
- ・早期落水の防止


### ジャンボタニシ防除

ピンク色の卵は水中に落としてください!  
※絶対に卵は手で触らない!  
ジャンボタニシが**活動を始めた時**が薬剤散布のタイミング!  
スクミンベイト3は水の濁りが落ち着いてから散布しよう!

### カメムシ防除

畦畔や圃場周辺の**除草**を行うことで発生リスクは低減します!  
**キラップ粒剤は出穂7日~10日前**が散布のタイミング!  
斑点米を減らそう!

● 種子更新 ● 生産履歴の記帳 ● 農産物検査の受検 **JA米の3要件**をしっかりと行いましょう!



### 土づくり (10a当たり)

| 資材名         | 使用時期       | 施用量     |
|-------------|------------|---------|
| 農力アップ       | 10月~3月     | 100kg   |
| ケイ酸加里プレミア34 | 出穂45日~35日前 | 20~40kg |

### 雑草防除 ◎初期除草剤 (10a当たり)

| 防除 | 除草剤名      | 使用時期        | 使用方法            |
|----|-----------|-------------|-----------------|
| ①  | エリジャン乳剤   | 代播後~移植7日前まで | 300ml 原液湛水散布    |
|    | エリジャンジャンボ | 代播後~移植7日前まで | 300g 小包装のまま投げ入れ |

### 種子消毒 (種粉 10kg水20L当たり)

| 資材名    | 対象病虫害                 | 使用方法            |
|--------|-----------------------|-----------------|
| タフブロック | いもち病・苗立枯病・ばか苗病・もみ枯細菌病 | 200倍 24時間浸種 催芽前 |

### ◎初・中期除草剤 (10a当たり)

| 防除 | 除草剤名      | 使用時期                        | 使用方法            |
|----|-----------|-----------------------------|-----------------|
| ②  | ジャスタ1キロ粒剤 | 移植時および移植直後~ノビエ3.5葉期移植後30日まで | 1kg 湛水散布        |
|    | ジャスタジャンボ  | 移植後1日~ノビエ3葉期移植後30日まで        | 400g 小包装のまま投げ入れ |

### 施肥基準 (10a当たり)

| 品種名          | 肥料銘柄            | 施肥量     |
|--------------|-----------------|---------|
| あきたこまち       | あきたこまち用ひとまきくん   | 50kg    |
|              | 早生・標準米ベスト【側条】   | 30kg    |
| コシヒカリ        | 早生用ひとまきくん       | 50kg    |
|              | 早生・標準米ベスト【側条】   | 30kg    |
| あいちのかおり      | 中生用ひとまきくん       | 60kg    |
|              | 中生用米ベスト【側条】     | 35kg    |
| あいちのかおり(十四山) | スーパーSRコート500中晩生 | 35~40kg |

### 病虫害防除 (10a当たり)

| 防除 | 除草剤名      | 対象病虫害                                   | 使用方法・時期           |
|----|-----------|---|-------------------|
| ①  | リディアNT箱粒剤 | ウンカ類・ツマグロヨコバイ・イネミズゾウムシ・イネドロオウムシ・ニカメイチュウ | 50g/箱 是種前~移植当日    |
| ③  | キラップ粒剤    | カメムシ類・ウンカ類                              | 3kg 湛水散布 出穂7~10日前 |
| ④  | スクミンベイト3  | スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)                       | 2~4kg 散布発生時       |

2022年10月1日登録反映  
農薬の使用にあたっては、有効期限(最終有効年月)以内の農薬を、ラベルの記載に従って使用してください。