

① ベタがけ資材の撤去（徒長防止） ② 速やかな圃場の排水 ③ 潮風を受けたり、どろ水で汚れた株や葉を水で洗浄																	他に登録のある主な野菜							
④ 被害部分の除去と傷口への殺菌剤の散布(黒腐れ病、べと病、黒斑細菌病・軟腐病などの細菌による病害の防除)																	オクラ	ゴボウ	タマネギ	ニンニク	ネギ	パレイシヨ	非結球レタス	レタス
⑤ 液肥の葉面散布、摘花・摘果、早いステージでの収穫による草勢回復																								
成分1	FRAC	成分2	FRAC	農薬名	キャベツ		ブロッコリー		カリフラワー		ハクサイ		ダイコン		ニンジン									
ストレプトマイシン	25	－	－	アグレプト水和剤 ※	黒腐病	2000倍 14日前 2回	－	－	－	－	軟腐病	1000-2000倍 14日前 3回	－	－	－	－			●		●		●	
ストレプトマイシン	25	－	－	アグレプト液剤 ※	黒腐病	2000倍 14日前 2回	－	－	－	－	軟腐病	1000-2000倍 14日前 3回	－	－	－	－			●		●		●	
ストレプトマイシン	25	チオファネートメチル	1	アタッキン水和剤 ※	菌核病 黒腐病	1500倍 14日前 2回	－	－	－	－	軟腐病 白斑病	1000倍 14日前 2回	－	－	－	－			●					
ストレプトマイシン	25	オキシテトラサイクリン	41	アグリマイシン-100 ※	黒腐病 黒斑細菌病	2000倍 14日前 2回	－	－	－	－	軟腐病 黒斑細菌病	1500-3000倍 14日前 3回	－	－	－	－			●	●	●		●	
ストレプトマイシン	25	オキシリニック酸	31	マテリーナ水和剤 ※	－	－	－	－	－	－	軟腐病	1000倍 14日前 3回	軟腐病	1000倍 30日前 2回	－	－			●		●			
カスガマイシン	24	銅	M01	カスミンボルドー ※／ カッパーシン水和剤 ※	黒腐病 黒斑細菌病 軟腐病	1000倍 7日前 4回	黒腐病	1000倍 7日前 4回	－	－	－	－	軟腐病 黒斑細菌病 ワッカ症	1000倍 14日前 3回	軟腐病 黒葉枯病 斑点細菌病	1000倍 7日前 2回	●	●	●	●	●	●	●	
カスガマイシン	24	オキシリニック酸	31	カセット水和剤 ※	黒腐病 黒斑細菌病 軟腐病	1000倍 7日前 3回	黒腐病	1000倍 14日前 2回	－	－	軟腐病 黒斑細菌病	1000倍 21日前 2回	軟腐病 黒斑細菌病	1000倍 14日前 3回	－	－			●	●	●	●	●	
－	－	オキシリニック酸	31	スターナ水和剤 ※	黒斑細菌病 軟腐病	1000倍 7日前 3回	軟腐病 黒斑細菌病 花蕾腐敗病	2000倍 14日前 2回	軟腐病	2000倍 14日前 2回	軟腐病 黒斑細菌病	1000倍 7日前 3回	軟腐病	1000倍 14日前 5回	軟腐病 斑点細菌病	1000倍 7日前 3回			●	●	●	●	●	
バリダマイシン	U18	－	－	バリダシン液剤 5 ※	黒腐病 株腐病 軟腐病	800倍 7日前 5回	黒腐病 軟腐病	800倍 前日 3回	－	－	軟腐病 黒斑細菌病	500倍 3日前 3回	軟腐病	500倍 7日前 4回	－	－			●	●	●	●	●	
有機銅	M01	オキシリニック酸	31	ナレート水和剤 ※	黒腐病 軟腐病	黒800倍 軟800～1000倍 14日前 3回	軟腐病	1000倍 14日前 2回	－	－	軟腐病 黒斑病 白斑病 べと病	軟600～1000倍 黒白べ800倍 30日前 3回	軟腐病	800～1000倍 21日前 3回	－	－			●	●	●	●	●	
－	－	オキシテトラサイクリン	41	マイコシールド ※	黒腐病	1000～2000倍 7日前 2回	花蕾腐敗病	1000～2000倍 14日前 2回	－	－	－	－	軟腐病	750～1000倍 14日前 3回	－	－				●				

注、農薬名の※印は、当JAの取り扱い商品です。

農薬の使用回数は成分ごとに定められていますので、同じ成分を含む薬剤の使用回数に注意ください。

転載・転用不可